

Influenzavaccination

Bemærk! Du må kun blive influenzavaccineret, **hvis du kan svare nej til følgende udsagn:**

- Har du tidligere haft alvorlige allergiske reaktioner i forbindelse med vaccination?
- Har du nogle allergier? (hvis ja, oplys det til vaccinatøren)
- Er du vaccineret mod influenza indenfor de seneste 6 måneder?
- Har du feber over 38° eller er du akut syg?

Informeret samtykke

Ved at give informeret samtykke til influenzavaccination bekræfter du, at:

1. du har modtaget information om formål, bivirkninger og hvor længe vaccinen virker, og accepterer at blive influenzavaccineret.
2. du har svaret "nej" til alle af punkterne på kontrollisten ovenfor.

Husk du skal blive til observation i 15 minutter efter vaccination.

Om influenza

Influenza er en smitsom virussygdom i luftvejene der hvert år rammer tusindvis af danskere – særligt i vinterhalvåret. Influenza varer som regel mellem to og syv dage, men hos personer i risikogrupper kan influenza give et alvorligere sygdomsforløb og i nogle tilfælde være dødelig. Almindelige symptomer kan være feber, muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine samt nedsat appetit.

Influenzavaccination

Vaccinen indeholder dele af inaktiverede virusvarianter, som ikke kan give sygdom, men som minder om de virus, der forventes at cirkulere i den kommende sæson. Når du bliver vaccineret, danner dit immunforsvar antistoffer, så kroppen kan bekæmpe infektionen hurtigere og mere effektivt, hvis du senere udsættes for influenzavirus. Vaccinen giver beskyttelse efter ca. 2-3 uger, og varer i ca. 6-12 måneder.

Bivirkninger ved vaccination

Almindelige bivirkninger: Let ømhed, rødme eller hævelse på indstiksstedet. Feber, hovedpine, udslæt eller muskel- og ledsmerter. Meget sjældne (1 ud af 10.000 eller færre): alvorlige allergiske reaktioner, kramper, neurologiske forstyrrelser eller betændelse i blodkar.

Vi registrerer automatisk din vaccination på sundhed.dk.

